

AUTOEVALUACIÓN**MÓDULO III: ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE MEDICAMENTOS**

1. La administración subcutánea:

- a) Debe llevarse a cabo por personal sanitario especializado
- b) Es conveniente rotar la zona de administración**
- c) En el caso de utilizar jeringas precargadas el ángulo de inyección debe ser de 45°
- d) Todas las respuestas son correctas

2. La administración subcutánea:

- a) Permite la implantación de comprimidos de liberación sostenida
- b) Las soluciones con vehículos oleosos no son recomendables
- c) Las soluciones con vehículos hidrosolubles son las más utilizadas
- d) Todas las respuestas son correctas**

3. La absorción subcutánea de fármacos:

- a) Está facilitada por la presencia de ácido hialurónico
- b) Se pueden utilizar sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras para controlar la velocidad de absorción**
- c) La temperatura corporal no afecta a la absorción
- d) La zona de administración empleada no afecta a la absorción

4. En la administración subcutánea:

- a) Una de las causas de aparición de lipodistrofias es no rotar las zonas de inyección
- b) La lipohipertrofia es más frecuente en hombres
- c) La lipoatrofia es más frecuente en mujeres
- d) Todas las respuestas son correctas**

5. La administración subcutánea:

- a) Se utiliza para la administración de insulina y otras hormonas
- b) La heparina por vía subcutánea se administra en la zona del abdomen
- c) Se utiliza en cuidados paliativos
- d) Todas las respuestas son correctas**