

Autoevaluación

1. Indique cual de los siguientes factores sistémicos influye en la cicatrización de las heridas.

- A. Estado nutricional
- B. Vascularización de la zona tratada.
- C. Edad del paciente.
- D. Tratamientos médicos
- E. Todos los anteriores

2. Seleccione la respuesta falsa

- A. El separador de Langenbeck está recomendado en sectores anteriores.
- B. Tras la intervención mantener una gasa comprimida favorece la hemostasia.
- C. Las pinzas de Adson pueden disponer o no de dientes.
- D. La cicatrización por primera intención es la idónea
- E. La inflamación crónica es una de las complicaciones de la cicatrización

3. Ordene de principio a fin las fase de la respuesta cicatricial. (ejemplo ABCD o CDAB):

- A. Fase de remodelación
- B. Fase inflamatoria.
- C. Fase de proliferación
- D. Fase de coagulación

Indique la secuencia _____

4. indique cual de las siguientes no corresponde a ninguna complicación de la cicatrización.

- A. Dehiscencia de suturas
- B. Necrosis
- C. Infección
- D. Déficit vitamínico
- E. Fibrosis

5. Indique cual es la respuesta verdadera

- A. Los mangos de bisturí circunferenciales permiten una mayor precisión que los planos.
- B. En todas las intervenciones quirúrgicas intraorales, la hoja de bisturí recomendada es la nº15.
- C. Las pinzas de disección dentadas fijan los tejidos blandos con mayor firmeza que las no dentadas.
- D. El periostotomo es necesario en las incisiones a espesor parcial.
- E. Todas las tijeras quirúrgicas tienen la misma longitud.

6. Indique cual de los siguientes incisiones se realiza sobre la fibromucosa palatina

- A. Incisión de Neumann parcial
- B. incisión de Partsch
- C. Incisión oval
- D. Incisión en doble Y
- E. Zetaplastia

7. Indique cual es la respuesta correcta

- A. Las incisiones a espesor parcial se utilizan en la extracción de terceros molares incluidos
- B. Los colgajos de espesor parcial no pueden ser desplazados.
- C. El colgajo de espesor total se realiza sin seccionar el periostio.
- D. Las incisiones a espesor parcial son las necesarias en las técnicas bilaminares con injerto conectivo
- E. En exéresis de torus palatino los 3 tipos de incisiones son válidos.

8. Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa

- A. La encía insertada se localiza entre la mucosa alveolar y encía marginal libre.
- B. El vértice del colgajo siempre debe ser mas amplia que la base del mismo.
- C. No se debe seccionar ni la papila ni el margen gingival por la mitad.
- D. Realizar las incisiones en un solo trazo no es necesario en tejidos sanos.
- E. La sutura en la encía queratinizada y en la mucosa alveolar se comporta del mismo modo.

9. Indique la respuesta falsa:

- A. La incisión de Neumann completa tiene 2 incisiones liberadoras verticales
- B. La incisión de Partsch está indicada en la extirpación de pequeños quistes.
- C. La incisión parcial de Neumann solo puede abarcar un diente a distal de la lesión.
- D. La incisión lineal se utiliza en el drenaje de abscesos.
- E. La incisión festoneada está indicada en la fenestración de caninos incluidos con acceso palatino.

10. En la incisión en doble Y el ángulo que forman las dos incisiones de los vértices respecto a la incisión mayor es de :

- A. 80°
- B. 100°
- C. 120°
- D. 140°
- E. 150°

11. En la exodoncia de tercero molares inferiores incluidos que precisen amplias ostectomías, la incisión recomendada es:

- A. Incisión Oval
- B. Incisión festoneada lineal
- C. Incisión supracrestal
- D. Incisión en bayoneta
- E. Incisión de Neumann completa

12. Los procesos de reabsorción de las suturas :

- A. Son por hidrólisis en el caso de las suturas sintéticas
- B. La degradación enzimática ocurre en suturas de origen natural
- C. El periodo de reabsorción varía dependiendo del material
- D. Pueden verse alterados por procesos febriles.
- E. Todas las anteriores son ciertas

13. La indicación en una sutura de " TB15" indica

- A. La reabsorción de la sutura
- B. La curvatura de la guja
- C. EL calibre del hilo en el sistema métrico (EP)
- D. Longitud de la sutura en pulgadas
- E. La sección de la aguja

14. Indique la respuesta falsa entro de las recomendaciones postoperatorias en las primeras horas.

- A. No debe enjuagarse
- B. Las bebidas que ingiera deben ser calientes
- C. No escupir
- D. No fumar
- E. Realizar ejercicios físicos intensos

15. Indique cual es la afirmación falsa sobre la Zetaplastia

- A. Es la incisión recomendada para la exéresis de frenillos atróficos.
- B. La incisión vertical forma un ángulo de 45-60º con cada una de las oblicuas
- C. A mayor longitud de las incisiones oblicuas mayor dificultad de cierre de la herida
- D. Tras la incisión, los dos triángulos de la herida deben ser desplazados.
- E. Existen otras incisiones para la eliminación de frenillos.

16. Las agujas de sutura no se diferencian por

- A. Su curvatura
- B. Su memoria elástica
- C. Su longitud
- D. su sección
- E. Todas las anteriores son ciertas

17. Indique la respuesta falsa.

- A. Las suturas de ácido poliláctico y poliglicólico son reabsorbibles
- B. Las suturas pueden clasificar en monofilamentos, bifilamentos y multifilamentos.
- C. La seda y el lino son naturales y de origen animal.
- D. Existen suturas de origen mineral
- E. Las suturas multafilamentosas tienen mayor capilaridad

18. Un técnica de sutura para mantener material hemostático en un alveolo es:

- A. Colchonero vertical
- B. Sutura continua
- C. Sutura suspensoria
- D. Sutura continua festoneada
- E. Sutura en X

19. Cual de las siguientes agujas curvas no se utiliza en la sutura intraoral?

- A. 3/8
- B. 1/2
- C. 6/8
- D. 1/4
- E. 5/8

20. Que propiedades no diferencian a las suturas?

- A. Diámetro
- B. Elasticidad
- C. Grado de oxidación
- D. Capacidad de reabsorción
- E. Capilaridad

Respuestas

1. A
2. A
3. DBCA
4. D
5. C
6. D
7. D
8. B
9. C
10. C
11. D
12. E
13. D
14. B
15. C
16. B
17. B
18. E
19. C
20. C