

Ariketa praktikoa Bena-barneko (IV) bolusa



Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-Partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/> helbidean.

Ariketa praktikoa

Bena-barneko (IV) bolusa

50 kg-ko emakume batu farmako bat bena barnetik administratu zitzaito. Dosia 4 mg/Kg. Ondoren odol laginak hartu ziren denbora ezberdinatan eta farmakoaren kontzentrazio plasmatikoak neurtu ziren:

Denbora (h)	0,25	0,5	1	3	6	12	18
Kontz. ($\mu\text{g/mL}$)	9,36	8,64	8,01	5,30	3,15	1,25	0,40

Informazio hau kontutan hartuz, galdera hauek erantzun:

- V_d , K_e y $t_{1/2}$, AUC_{inf} eta Cl kalkulatu
- Farmakoa ez da eraginkorra kontzentrazio plasmatikoa $2 \mu\text{g/mL}$ baino baxuagoa denean. Hau kontutan hartuz, zenbat iraungo du farmakoaren aktibitateak?
- Dosia bikoitza izango balitz, zenbat luzatuko zen eraginaren iraupena?