

## **Autoevaluación**

**1. Indique cual de las siguientes complicaciones no corresponde a problemas técnicos o estructurales**

- A. Fractura del pilar o muñón
- B. Aflojamiento del pilar
- C. Desgaste de caras oclusales
- D. Ejes de tornillos por la cara vestibular del diente
- E. Fractura del armazón

**2. Indique cual no corresponde a una complicación funcional de acuerdo a la clasificación de Bert.**

- A. Problemas fonéticos
- B. Infección persistente.
- C. Retención alimentaria.
- D. Movilidad del implante
- E. No corresponden las respuestas B y D

**3. Las complicaciones postoperatorias tardías son aquellas que ocurren:**

- A. a partir de las 48 horas de la cirugía
- B. Tras la rehabilitación.
- C. Durante la osteointegración
- D. Inmediatas a la cirugía y durante la cicatrización de los tejidos blandos
- E. Durante la cirugía

**4. Señale cual de las siguientes no corresponde a ninguna etiología de las complicaciones:**

- A. Estéticas
- B. Funcionales
- C. Mucosas
- D. Biológicas
- E. Técnicas o mecánicas

**5. Indique cual es la respuesta verdadera. La planificación prequirúrgica debe incluir**

- A. Estudio radiológico
- B. Estudio protético
- C. Medicación preoperatoria.
- D. Selección de material y preparación del mismo
- E. Todas las anteriores son ciertas

**6. Entre los factores de riesgo para la osteointegración o supervivencia de implantes no se incluye:**

- A. Tabaco
- B. Bisfosfonatos
- C. Diabetes
- D. Hipertensión
- E. Radioterapia

**7. Indique cual es la respuesta correcta. La exploración intra y extraoral debe permitir valorar:**

- A. Apertura bucal
- B. Biotipo gingival
- C. Enfermedad gingival o periimplantaria
- D. Patología de tejidos blandos
- E. Todas son ciertas.

**8. Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa**

- A. La OPG es la prueba radiológica de elección en casos de escasa oferta ósea.
- B. El TAC o CBCT presenta la menor magnificación de todas las pruebas radiológicas
- C. La radiografía periapical es de gran valor en el seguimiento de los implantes
- D. Los software de planificación permiten realizar cirugías guiadas con férulas de manera predecible.
- E. El CBCT permite variar el campo de visión

## **9. Indique la respuesta falsa. El estudio protético permite**

- A. Realizar férulas quirúrgicas o radiológicas
- B. estudiar la oclusión.
- C. Valorar los tejidos blandos.
- D. Realizar encerados diagnósticos
- E. Determinar le número de implantes y ubicación.

## **10. Indique la respuesta verdadera :**

- A. El consentimiento informado solo es preciso en tratamiento con regeneración ósea guiada
- B. No existe evidencia sobre el uso de antibióticos previos al cirugía de implantes
- C. El riesgo de sangrado en la sínfisis mandibular se debe principalmente a la arteria milohioidea
- D. Los corticoides solo se utilizan en injertos óseos en bloque
- E. La perforación de la cortical mandibular puede poner en riesgo la vida del paciente

## **11. Señale la respuesta falsa:**

- A. La técnica de subfresado permite incrementar la estabilidad primaria en casos de baja calidad ósea
- B. En el tratamiento de las dehiscencias, las membranas no reabsorbibles proporcionan mejores resultados clínicos
- C. En el caso de precisar un injerto óseo en bloque intraoral, el injerto de mentón es el que menor incidencia de complicaciones presenta
- D. Son correctas las respuestas B y C
- E. Son correctas las respuestas A y B

**12. Indique cual de las siguientes complicaciones no está clasificada como intraoperatoria:**

- A. Lesión de dientes adyacentes
- B. Invasión de estructuras anatómicas
- C. Exposición del implante
- D. Falta de estabilidad primaria.
- E. Todas las anteriores son ciertas

**13. Cual de los siguientes factores puede provocar la dehiscencia de los tejidos blandos**

- A. Presencia de hematomas o edemas
- B. Presión ejercida por la prótesis removible
- C. Traumatismo por dientes antagonistas
- D. Excesiva tensión en la sutura
- E. Todas son ciertas

**14. Indique la respuesta falsa dentro de las recomendaciones postoperatorias en las primeras horas.**

- A. No debe enjuagarse
- B. Las bebidas que ingiera deben ser calientes
- C. No escupir
- D. No fumar
- E. Realizar ejercicios físicos intensos

**15. La migración de un implante al seno maxilar se debe solucionar**

- A. Mediante un abordaje quirúrgico con la técnica de Cadwell Luc.
- B. Dejando el implante en el seno mientras no exista sintomatología
- C. Mediante endoscopia nasal
- D. Mediante endoscopia intraoral del seno maxilar a través de la fosa canina.
- E. Son ciertas las respuestas A, C y D.

**16. El tratamiento de las alteraciones neurosensoriales puede consistir en**

- A. Tratamiento farmacológico
- B. Tratamiento quirúrgico
- C. Terapia física
- D. Las respuestas A y B son verdaderas
- E. Las respuestas A, B y C son verdaderas

### **17. Indique la respuesta verdadera.**

- A. Las descementaciones ocurren con mayor frecuencia en pilares altos
- B. La fractura de un pilar implica la extracción de un implante
- C. Los tornillos protéticos no se rompen por estar aflojados.
- D. Todas las respuestas son falsas
- E. Los implantes de conexión interna presentan mayores aflojamientos que los implantes de conexión externa

### **18. Respecto a las fracturas de la cerámica:**

- A. Entre sus causas está la inadecuada ceramización
- B. Todas las respuestas son ciertas
- C. Presenta mayor prevalencia que las fracturas de la estructura
- D. Existen fracturas de tipo cohesivo y adhesivo
- E. La escasa compatibilidad entre el metal y la cerámica puede provocarla

### **19. Indique cual no es una característica de las mucositis reversibles**

- A. Existe sangrado al sondaje
- B. Presentan un ligera pérdida ósea
- C. Presenta similitud con la gingivitis
- D. Se caracteriza por la presencias de P. Gingivalis, T. Denticola y T. Forsythia
- E. Todas las respuestas son verdaderas

### **20. Indique la respuesta correcta de acuerdo al protocolo de tratamiento de la periimplantitis descrito por Robertson**

- A. La cirugía regenerativa se debe realizar con perdidas menores de 3mm
- B. Todas las respuestas son falsas
- C. La cirugía resectiva se realiza con reposición apical de tejidos blandos y implantoplastia
- D. La explantación se debe realizar en defectos mayores de 4mm
- E. Las respuestas A y C son verdaderas

## Respuestas

1. D
2. E
3. C
4. C
5. E
6. D
7. E
8. B
9. C
10. E
11. D
12. E
13. E
14. E
15. E
16. E
17. D
18. B
19. B
20. C