

BLOQUE II: Farmacología Aplicada: Situaciones especiales

1. Utilización de fármacos en el embarazo (Tema 8)

Indique si el uso de los siguientes fármacos es seguro durante la gestación y la categoría según la clasificación de la FDA:

Amoxicilina + ácido clavulánico

Metronidazol

Doxiciclina

Paracetamol

Ibuprofeno

Diclofenaco

Lidocaína + adrenalina

Articaína + fenilpresina

2. Utilización de fármacos en la mujer lactante (Tema 8)

Precisa prescribir metronidazol a una mujer que se encuentra en el periodo de lactancia. ¿Es seguro este tratamiento? ¿Qué advertencias/consejos le daría?

3. Utilización de fármacos en geriatría (Tema 9)

De acuerdo a los criterios STOPP-START propuestos por la Sociedad Europea de Geriatría para detectar prescripciones potencialmente inapropiadas en pacientes ancianos, revise las siguientes prescripciones y seleccione la casilla apropiada (STOPP o START) en las situaciones clínicas propuestas (herramienta para realizar el ejercicio: INFAC volumen 23, nº2, 2015).

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/adjuntos/INFAC_Vol_23_n_2_revisando%20medicacion%20anciano.pdf



	STOPP	START
Ibuprofeno en paciente con hipertensión grave		
Acenocumarol en combinación con AAS		
IECA en paciente con insuficiencia cardíaca crónica		
Ticlopidina		
Warfarina en paciente con fibrilación auricular		
Omeprazol en paciente que toma 150 mg/día de AAS		
Laxante en paciente tratado con fentanilo		
Bromuro de ipratropio en paciente con glaucoma de ángulo estrecho		

4. Utilización de fármacos en pediatría (Tema 10)

Mikel es un niño que acude a la consulta y precisa una intervención odontológica con utilización de anestésicos locales. Teniendo en cuenta que pesa 18 kg y la dosis máxima de lidocaína que puede utilizarse en niños es de 4,4 mg/kg de peso ¿Cuántos cartuchos de anestésico (lidocaína al 2%), como máximo, podrían administrarse a este niño?

