

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III

Elige la respuesta correcta. En cada pregunta planteada sólo una respuesta es la correcta.

1. Elija la afirmación correcta con respecto a los AINEs:

- a. Gracias a su potente acción analgésica son útiles en el tratamiento de dolor de carácter grave
- b. A dosis altas, la aspirina es más eficaz que el ibuprofeno en el alivio del dolor
- c. Las dosis requeridas para obtener el efecto antiinflamatorio son inferiores a las que se obtiene el efecto analgésico
- d. Son más eficaces en situaciones de inflamación aguda que en patologías inflamatorias crónicas
- e. Siempre se deben prescribir junto con un inhibidor de la bomba de protones para prevenir el daño gastrointestinal

2. Entre los siguientes analgésicos, uno se caracteriza por NO producir alteraciones gastrointestinales, ¿cuál?:

- a. Ibuprofeno
- b. Paracetamol
- c. Ácido acetilsalicílico
- d. Diclofenaco
- e. Dexketoprofeno

3. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la dipirona:

- a. Es analgésica
- b. Puede producir daños hematológicos
- c. Es antipirética
- d. Se puede administrar tanto por vía oral como por vía parenteral
- f. Es antiinflamatoria

4. ¿ Elija la afirmación que no es correcta respecto al tratamiento de las infecciones bacterianas en Odontología:

- a. El tratamiento de elección en una infección odontogénica es la amoxicilina o la amoxicilina combinada con ácido clavulánico
- b. El fármaco de elección en la profilaxis antibiótica es la eritromicina
- c. Entre los fármacos con los que interaccionan los antibióticos se encuentran los anticoagulantes y los anticonceptivos orales
- d. La colitis pseudomembranosa puede aparecer como consecuencia de un tratamiento con clindamicina
- e. La doxiciclina no debe ser utilizada durante la gestación



5. **Con respecto a la prescripción de antifúngicos en Odontología:**
- a. El miconazol es un antifúngico azólico que se da en casos graves de candidiasis orofacial por vía oral
 - b. La nistatina tópica es útil en el tratamiento de la estomatitis asociada a la dentadura postiza
 - c. El fluconazol se administra por vía tópica en forma de gel y tiene buena adherencia a la mucosa
 - d. El tratamiento no debe exceder los 7 días de duración
 - e. Ninguna de las anteriores
6. **La clorhexidina:**
- a. Es un fármaco antiséptico con bajo índice de adhesividad
 - b. Se utiliza en enjuagues bucales formulado al 2%
 - c. Se utiliza en enjuagues bucales al 0,02%
 - d. Únicamente está indicada para su aplicación durante largos periodos
 - e. Entre sus indicaciones se encuentra el tratamiento de las aftas con úlceras
7. **El tratamiento farmacológico de la gingivitis ulcerativa necrosante aguda es:**
- a. Metronidazol
 - b. Azitromicina
 - c. Fluconazol
 - d. Doxiciclina
 - e. Aciclovir
8. **El fármaco de primera elección en la sedación odontológica para la realización de una intervención corta es:**
- a. Triazolam
 - b. Diazepam
 - c. Midazolam
 - d. Lormetazepam
 - e. Clobazam



9. Elije la respuesta incorrecta con respecto a los vasoconstrictores asociados a los anestésicos locales:

- a. Su utilización prolonga el efecto anestésico
- b. Su utilización aumenta la potencia anestésica
- c. Reducen la toxicidad sistémica de los anestésicos
- d. En el cartucho, la cantidad de vasoconstrictor aparece expresada en porcentaje (%)
- e. Fenilpresina es el vasoconstrictor de elección en pacientes con enfermedad cardiovascular

10. Prescripción de anestésicos locales. Elija la respuesta correcta:

- a. Lidocaína (1%) + adrenalina (1:100.000) se administra en forma de gel de manera tópica para el tratamiento de úlceras
- b. Lidocaína (2%) + fenilpresina (1:50.000) puede utilizarse como hemostático
- c. Lidocaína (2%) + adrenalina (1:50.000) se utiliza como refuerzo de una anestesia infiltrativa con lidocaína estándar
- d. Articaína es la única que se utiliza en presentación de 0,4%
- e. Prilocaína tiene mejor incidencia de reacciones alérgicas cruzadas con otros anestésicos

