

II ATALA: Farmacologia Aplikatua Odontologian: Egoera bereziak

1. Farmakoen erabilpena haurdunaldian (8 Gaia)

Aipatu farmako hauek haurdunaldian seguruak diren eta FDAren sailkapenean ze mailakoak diren

Amoxizilina + azido klabulaniko

Metronidazol

Doxiziklina

Parazetamol

Ibuprofeno

Diklofenako

Lidokaina + adrenalina

Artikaina + fenilpresina

2. Farmakoen erabilpena edoskitzaroan (8 Gaia)

Odontologoak metronidazol preskribatu behar du edoskitzaroan dagoen emakume bati. Segurua da tratamendua? Ze informazio/gomendio emango lioke?

3. Farmakoen erabilpena zahartzaroan (9 Gaia)

Europako Geriatria Batzordeak zahartzaroan preskripzio ez-egokiak antzemateko asmoz proposatutako STOPP-START irizpideen arabera, aztertu hurrengo preskripzioak eta aukeratu START edo STOPP kasu bakoitzean emandako egoera klinikoetan (ariketa egiteko tresna: INFAC 23, 2 zenbakia, 2015).

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime_adjuntos/INFAC_Vol_23_n_2_revisando%20medicacion%20anciano.pdf



	STOPP	START
Ibuprofeno eta hipertentsio arteal larria duen pazientea		
Acenocumarol AAS-arekin elkartua		
AEBI (IECA) eta bihotz gaixotasun kronikoa duen pazientea		
Tiklopidina		
Warfarina eta fibrilazio aurikular pairatzen duen pazientea		
Omeprazol eta 150 mg AAS/egunean hartzen duen pazientea		
Libragarria eta fentanilo hartzen duen pazientea		
Ipratropio bromuroa eta angelu estuko glaukoma duen pazientea		

4. Farmakoen erabilpena pediatrian (10 Gaia)

Mikel kontsulta odontologikora doan haurra da, anestesiko lokalen erabilpena eskatzen duen aho-prozedura egitera. Bere pisua 18 kg delarik eta pediatrian lidokaina gehienezko dosia 4,4 mg/kg pisuko dela jakinik, gehienez zenbat lidokaina kartutxo (lidocaína 2%) eman diezaioke odontologoak haur honi?

