

## Bloque II: PREGUNTAS AUTOEVALUACION

---

**1. Son clasificaciones mecánicas de las RAM:**

- a. ABCDEF
- b. EIDOS
- c. DOTS
- d. En base a frecuencia
- e. A y b

**2. Una hemorragia con anticoagulantes, se clasificaría como una RAM tipo:**

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D
- e. F

**3. Sobre las RAM tipo A, es verdad que:**

- a. Las alteraciones farmacocinéticas que dan lugar a problemas de eliminación son las más relevantes
- b. Son poco frecuentes
- c. Las alteraciones farmacodinámicas nunca dan lugar a RAM tipo A
- d. Una inducción del citocromo P450 podría dar lugar a una acumulación de metabolitos tóxicos
- e. A y d

**4. Sobre las RAM tipo B, no es cierto que:**

- a. Son raras
- b. Pueden ser reacciones de hipersensibilidad
- c. No tienen relación con la dosis
- d. Principalmente tienen que ver con causas farmacéuticas
- e. Tienen mortalidad elevada

**5. La exposición a fármacos oxidantes debe evitarse en aquellos con:**

- a. Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- b. Alergia a penicilinas
- c. Mutaciones del receptor de rianodina
- d. Insuficiencia renal
- e. Úlceras varicosas

**6. Entre las siguientes interacciones, ¿cuáles se refieren a interacciones farmacodinámicas?**

- a. Warfarina y AAS
- b. iMAO y tiramina
- c. Fenitoína y warfarina
- d. A y b
- e. A, b y c

**7. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre fármacos interaccionantes y posible efecto clínico es FALSA?**

- a. Clopidogrel y omeprazol → Riesgo de trombosis
- b. Warfarina y fluoxetina → Riesgo de sangrado
- c. Tamoxifeno y fluoxetina → Riesgo de cáncer de mama
- d. Warfarina y carbamazepina → Riesgo de sangrado
- e. Fenitoína y anticonceptivos orales → Embarazo no deseado

**8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- a. Los portadores de variantes de CYP2C9 lentas necesitan dosis menores de warfarina que los portadores de CYP2C9 no polimórficas
- b. En portadores de variantes de CYP2C9 lentas el riesgo de hipoglucemia por sulfonilureas es mayor
- c. Los portadores de CYP2C19 de carácter rápido podrían sufrir mayor riesgo de hemorragia por clopidogrel
- d. Un mecanismo de resistencia a anticancerígenos consiste en la sobreexpresión de glicoproteína P
- e. Los pacientes que carecen de actividad CYP2D6 pueden necesitar dosis menores del profármaco tamoxifeno

**9. Sobre las discinesias, es cierto que:**

- a. Sólo son inducidas por la exposición crónica a fármacos agonistas dopaminérgicos
- b. Pueden ser inducidas por exposición crónica a fármacos que bloquean la transmisión dopaminérgica
- c. El tratamiento más eficaz es administrar dopamina
- d. Desaparecen al ser tratadas con antagonistas dopaminérgicos como los neurolepticos
- e. Ocurren por un fenómeno de rebote al dejar el tratamiento con L-DOPA

**10. Sobre la teratogénesis, es falso que:**

- a. Los fármacos son responsables de alrededor del 5% de los efectos teratogénicos
- b. Tanto los andrógenos como estrógenos producen efectos teratogénicos
- c. Los antiepilépticos están clasificados como fármacos de Nivel X según la FDA

- d. La exposición a teratógeno las dos primeras semanas del embarazo podría ser detectada como un problema de fertilidad
- e. En general, el período fetal es el menos sensible a la acción de fármacos teratógenos