

## Autoevaluación

### Preguntas de elección de respuesta.

1. El patrón de reabsorción de los maxilares:
  - a. Es centrípeto en ambos maxilares
  - b. Es centrífugo en ambos maxilares
  - c. Es centrípeto en el maxilar superior y centrífugo en el inferior
  - d. Es centrípeto en el maxilar inferior y centrífugo en el maxilar inferior
  
2. En la clasificación de El-Ghareeb, clasificación de UCLA, sobre el reborde alveolar la denominada Clase III Mayor, corresponde a:
  - a. Reborde alveolar con un defecto de anchura a nivel apical
  - b. Reborde alveolar con un déficit de anchura ósea a nivel apical y coronal
  - c. Reborde alveolar con un pequeño defecto de altura ósea
  - d. Reborde alveolar con defecto de ventana o fenestración vestibular
  
3. La irrigación de seno maxilar depende directamente:
  - a. De la arteria sinusal superior posterior
  - b. De la arteria alveolar superior posterior
  - c. De la arteria circunfleja superior posterior
  - d. De la arteria supraorbitaria
  
4. Entre los diferentes procedimientos utilizados para tratar los maxilares atróficos, al que en la literatura científica se le atribuye el mayor porcentaje de complicaciones es:
  - a. El procedimiento transcristal
  - b. El procedimiento mediante antrostomía directa con ventana, sin reposición
  - c. El procedimiento mediante antrostomía directa con reposición de ventana
  - d. El procedimiento con implantes zigomáticos
  
5. Sobre la rinosinusitis aguda señale la respuesta correcta:
  - a. Presenta congestión nasal, secreción mucosa patológica y dolor cefálico
  - b. Es una contraindicación absoluta para realizar elevación de seno maxilar
  - c. La imagen radiográfica del seno refleja ocupación
  - d. Todas son correctas
  
6. La presencia de septos intrasinales:
  - a. Es más frecuente en pacientes edéntulos.
  - b. Es más frecuente en zonas molares
  - c. Se estima que su prevalencia es superior al 16%
  - d. Todas son correctas

7. La antrostomía mediante tecnología piezoeléctrica:
  - a. Se ejecuta de forma más rápida que la técnica rotatoria convencional.
  - b. No supone ningún avance respecto a roturas de membrana frente a la técnica rotatoria convencional
  - c. Tiene menor índice de fracasos de los implantes insertados en senos elevados, frente a la técnica rotatoria convencional
  - d. Todas son falsas
  
8. El porcentaje de fracasos de implantes insertados en maxilares, tras la elevación del seno con biomateriales:
  - a. Ha sido mayor con injerto óseo en bloque
  - b. Ha sido mayor con hueso autólogo particulado
  - c. Ha sido mayor con hueso autólogo particulado mezclado con sustitutos óseos
  - d. a y b son correctas, c es incorrecta
  
9. Sobre las incisiones en el periostio:
  - a. Están indicadas para evitar tensiones en las suturas
  - b. Se recomienda hacerlas tras la incisión inicial, para evitar el sangrado al final de la intervención quirúrgica
  - c. Hay que evitar la perforación del colgajo
  - d. Todas son correctas
  
10. En rehabilitaciones con implantes:
  - a. A mayor longitud del implante menor reducción de la tensión
  - b. A mayor diámetro del implante menor reducción de la tensión
  - c. A mayor diámetro del implante mayor reducción de la tensión
  - d. Son correctas a y c
  
11. De las siguientes una afirmación es *falsa*:
  - a- La reabsorción maxilar presenta un patrón centrípeto
  - b- Las clasificaciones de la reabsorción de Chiapasco y Katsuyama, determinan el tipo de tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de reabsorción
  - c- La presencia de septos facilita la elevación sinusal
  - d- El TAC de híz cónico presenta mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico que la ortopantomografía
  - e- Todas son verdaderas
  
12. La elevación sinusal mediante técnica de antrostomía esta indicada en rebordes óseos con altura
  - a- Superior a 10mm
  - b- de 7-10mm
  - c- de 5-10mm
  - d- de 0-5mm
  - e- Todas son falsas

13. Según la evidencia actual y en relación al material injertado en la elevación sinusal, los mejores resultados se logran con :
- a- Injerto hetérológico
  - b- injerto autólogo
  - c- injerto autólogo + Injerto hetérológico en proporción 20% - 80%
  - d- injerto autólogo + Injerto hetérológico en proporción 80% - 20%
  - e- injerto autólogo + Injerto hetérológico en proporción 50% - 50%

#### Respuestas

- 1-c
- 2-a
- 3-b
- 4-d
- 5-d
- 6-d
- 7- b
- 8- a
- 9- d
- 10- c
- 11-c
- 12-c
- 13-e

**PONER ENTRENAR CON HUEVOS**  
**RESALTAR UTILIDAD DEL INSTRUMENTAL ESPECIFICO**