

III ATALA

B.- Bestelako aparatuak eta sistemak.

1. Iratiren tristura

Iratik, azken 2 hilabetetan 10 kg galdu dituen, oso triste, ezgai eta indargabe sentitzen dela eta lo egiteko arazoak izan dituela azken hilabetetan azaltzen dio familiako medikuari. Medikua, oso galdetegi zehatza egin ondoren argi dauka diagnostikoa, depresio nagusia, ondorioz eszitalopram agintzen dio. Bi aste pasa ondoren Iratik kontsultara deitzen du tratamendua ez dela eraginkorra esateko. Medikua tratamenduarekin jarraitzea gomendatzen dio. Asteak pasa ahala, Irati gero eta hobeto dago, hala ere sorbaldako mina oso biziagatik medikuak tramadol agintzen dio diagnostiko probak egiten zaizkion bitartean. Arratsalde batean lagun batek ospitaleko larrialdietara eramaten du Irati dardarka, goitikekin eta ohargabeko muskulu mugimenduak (miokloniak) zituela.

Galdera hauei erantzuna eman Iratiri zer gertatu zaion argitzeko:

Zer ekintza mekanismoa dauka eszitalopramek?

Zergatik behar du Iratik ~3 asteko tratamendua eragin antidepressiboa sumatzeko?

Erantzun klinikoa azkarragoa izango litzateke beste antidepressiboa erabiltzekotan?

Zer da tramadola eta zein da bere ekintza mekanismoa?

2.- Digestio-aparaturi buruzko kasua

1. 65 urtetako emakumea, zenbait aurrekari ditu: azken hilabeteetan ondo kontrolaturiko hipertentsio arteriala, bi urteko garapeneko eta control metaboliko onargarririk ez duen hipertrigliceridemia eragindao dislipemia, loditasuna eta artrosia. Gainera ultzera peptikoa pairatu du.

Ohiko tratamendua hau izanik:

- a. Kaptopril 25 mg 1-1-1
- b. Atorbastatina 20 mg 1-0-0
- c. Nimodipino 30 mg 1-1-1
- d. Omeprazol 20 mg 1-0-0

Orkatilan bihurritua sufritu du eta lotailu peroneoastragaliano eta perokalkaneoak handituta eta hematoma sintomekin dituelarik. Balantze articularra kontserbatua baina minak mugatua. Es dago beste aurkikuntzarik. Tratamendu farmakologikoa gehitzen zaio daraman ohiko tratamenduari: diclofenaco 50 mg 1-1-1

1. Indikatuta dago urdail-babesleen erabilera?
2. 10 urte daramatza omeprazol hartzen, ba al dago arazorik ezagutzen omeprazolaren denbora luzeko erabilerarekin erlazionatuta?
3. Azkenaldi honetan pazienteak tratamendu antikoagulatzaila behar du eta klopido grela ematen diote. Zuzena al da preskripzioa?

3.- Arnas aparatuari buruzko kasua

Samuel, 36 urteko gizona, fisioterapeutaren kontsultara hurbiltzen da ukondoko errehabilitazio prozesua hasteko. Tratamenduaren hasieratik fisioterapeutak nabaritzen du pazienteak terapia oztopatzen duen eskuetako dardara fina duela. Pazientea oso urduri dago eta komentatzen dio asmatikoa dela eta asmarako tratamendu bat jarraitzen duela. Uste duzu daradara horren jatorria farmakologikoa dela? Eta urduritasunaren jatorria?

4.- Aparatu kardiobaskularrari buruzko kasua

Mikel hiri osoko hoberen eta garestiena den abokatu-bulego baten abokatua da. Egunero 12-14 ordu lanean ematen ditu eta estresa paoratzen du. Abokatu-bulego horretan lanean hasi zenean bizimodu osasuntsua jarraitzen zuen, baina gaur egun egunero 20 zigarro inguru erretzen ditu eta 15kg-ko gehiegizko pisua dauka. Gainera, dule 15 urtetik hona hipertentsioa pairatzen du. Honetarako tratamendua: diuretikoak + beta-blokeatzaile kardioselektiboak + basozabaltzailea.

Lanetik etxera bueltan zihoala istripu bat eduki du: kotxe batek harrapatu du. Ospitalean pelbisa apurtuta daukala diote, haustura garbia, ez du ebakuntzarik behar, baina bai errehabilitazioa. Fisioterapeutak gomendatzen dio errehabilitazioa igerileku terapeutiko batean egitea (35°C-ko tenperaturarekin).

Ze arazo ager daitezke tratamenduarekin? Arrazoitu erantzuna

5.- Odolaren farmakologiari buruzko kasua

E.P., 47 urteko emakumea. 35kg-ko gehiegizko pisua. Bigarren solairuko logelan zegoela erle pare bat uxatu nahian ez zen konturako leihoak zabalik zeudela eta leihotik jausi zen. Horren ondorioz L-1 eta L-2 ornotan konpresio-apurketak ditu. Ospitalean hartu eta diagnostikoak bizkar-muina partzialki moztuta zeukala eta funtzio motorea eta sensoriala gutxituta edukiko zuela dio. Errehabilitazio terapia hasten du, bai fisikoa bai okupazionala. Dena ondo zihoan arnasa ezin zuela hartu eta bularrean min akutua sentitu zuenean. Diagnostikoa: biriketako enbolismo masiboa.

Zergatik gertatu zaio horrelakoa? Zer tratamendu proposatuko zenuke? Arrazoitu erantzuna

6.- Hematopoiesiaren farmakologiari buruzko kasua

C.F., 22 urteko kirolaria, bihotzeko gastu altua eskatzen duen kirolan dihardu. Osasuntsua. Aldizka egiten dizkiote osasun azterketak. Inoiz ez du pairatu ez bihotzeko gaixotasunik ezta anemia ere.

Bere taldeko kideekin Alpeetako hotel batean zegoelarik, goiz batean ez zen esnatu. Hilda aurkitu zuten. Beste kide batzuk esnatzean ondoeza eta hotzikarak zituzten.

Zer gertatu zaio? Arrazoitu erantzuna