BLOQUE A-II: Matrices y determinantes – Matriz adjunta, determinante e inversa

EJERCICIO 1:

Sea la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

- Calcula la matriz adjunta de la matriz A
- Obtén el determinante de la matriz A mediante el desarrollo por filas o columnas de la misma.
- Calcula matriz inversa de la matriz A, (A^{-1}) .

Solución:

- Primero se debe calcular el elemento adjunto de cada elemento de la matriz A, es decir, se deben obtener el menor y el signo correspondiente a cada elemento:

$$A^* = \begin{pmatrix} (+1) \cdot \begin{vmatrix} 6 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & -3 & 0 \end{vmatrix} \\ (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & -3 & 0 \end{vmatrix} \\ (+1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 6 & 0 & -5 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -5 \\ 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 6 & -5 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \end{vmatrix} \\ (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 6 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -5 \\ -2 & 3 & 4 \end{vmatrix} & (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 6 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} & (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 81 & -96 & 218 & -99 \\ 97 & 178 & -4 & 7 \\ -108 & 128 & 86 & 132 \\ 131 & 54 & -52 & 91 \end{pmatrix}$$

La matriz adjunta es la traspuesta de la matriz anterior:

$$A^a = (A^*)^t = \begin{pmatrix} 81 & 97 & -108 & 131 \\ -96 & 178 & 128 & 54 \\ 218 & -4 & 86 & -52 \\ -99 & 7 & 132 & 91 \end{pmatrix}$$

b) Mediante el desarrollo de la primera columna se tiene que el determinante es:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{21} \cdot A_{21} + a_{31} \cdot A_{31} + a_{41} \cdot A_{41}$$

siendo a_{ij} el elemento de la matriz A que ocupa la posición (i,j) y A_{ij} su elemento adjunto.

Por tanto, sustituyendo los valores se tiene que:

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 6 & 0 & -5 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 6 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (81) + 1 \cdot (97) + (-2) \cdot (-108) + 5 \cdot (131) = 1130$$

Si se selecciona otra columna para calcular el determinante, obtenemos el mismo valor. Por ejemplo, a continuación, se obtiene el valor del determinante utilizando para ello el desarrollo mediante la tercera columna:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} = a_{13} \cdot A_{13} + a_{23} \cdot A_{23} + a_{33} \cdot A_{33} + a_{43} \cdot A_{43} =$$

$$\begin{aligned}
 &= 4 \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} + 3 \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 6 & -5 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 6 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \\
 &= 4 \cdot (218) + 0 + 3 \cdot (86) + 0 = 1130
 \end{aligned}$$

Además, si se utiliza la segunda columna para obtener el determinante se tiene el siguiente desarrollo:

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & -5 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} = a_{21} \cdot A_{21} + a_{22} \cdot A_{22} + a_{23} \cdot A_{23} + a_{24} \cdot A_{24} = \\
 &= 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix} + 6 \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 7 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} + (-5) \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \\
 &= 1 \cdot (-97) + 6 \cdot (178) + 0 \cdot (-4) + (-5) \cdot (7) = 1130
 \end{aligned}$$

Se concluye que para obtener el determinante se puede utilizar cualquier columna o fila de matriz, siendo su valor siempre el mismo.

c) La fórmula para obtener la matriz inversa de la matriz A es:

$$A^{-1} = \frac{A^a}{|A|}$$

Es decir, para obtener la matriz inversa de matriz A basta dividir su matriz adjunta por el determinante de la misma.

En el apartado a) del ejercicio se ha calculado la matriz adjunta de matriz A y en el apartado b) se ha obtenido el determinante de la matriz A. Por tanto, sustituyendo dichos valores en la fórmula:

$$A^{-1} = \frac{A^a}{|A|} = \frac{1}{1130} \begin{pmatrix} 81 & 97 & -108 & 131 \\ -96 & 178 & 128 & 54 \\ 218 & -4 & 86 & -52 \\ -99 & 7 & 132 & 91 \end{pmatrix}$$

Finalmente mencionar que, si una constante multiplica o divide una matriz, dicha constante multiplica o divide cada elemento de la matriz.

EJERCICIO 2:

Calcula la matriz inversa de la matriz A utilizando para ello el método de Gauss-Jordan:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución:

El método de Gauss-Jordan transforma un sistema $(A|I)$ en otro equivalente $(I|A^{-1})$ utilizando para ello operaciones elementales por filas, es decir:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) A^{-1}$$

Primero intentaremos convertir el elemento $a_{11} = 2$ en un 1. Por ejemplo, se puede dividir la primera fila por 2, o se pueden intercambiar la primera y la segunda fila. En este caso aplicaremos la segunda opción:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F1 \leftrightarrow F2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

A continuación, deben anularse los elementos de la primera columna que no estén en la diagonal principal, es decir, $a_{21} = 2$ y $a_{31} = -2$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F2 \leftarrow F2 - 2F1 \\ F3 \leftarrow F3 + 2F1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -13 & 4 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 13 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

Se repite el proceso. Es decir, se obtiene un 1 en el segundo elemento de la diagonal principal $a_{22} = -13$,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -13 & 4 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 13 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F2 \leftarrow F2 / (-13)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 13 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

A continuación, se anulan los elementos de la segunda columna que no están en la diagonal principal, es decir, $a_{12} = 6$ y $a_{32} = 13$,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 13 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F1 \leftarrow F1 - 6F2 \\ F3 \leftarrow F3 - 13F2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24/13 & 6/13 & 1/13 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Se aplica el mismo proceso en la tercera columna. Primero, se obtiene un 1 en el tercer elemento de la diagonal principal,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24/13 & 6/13 & 1/13 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F3 \leftarrow F3/7} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24/13 & 6/13 & 1/13 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/7 & 0 & 1/7 \end{array} \right)$$

Y realizando operaciones elementales por filas se anulan los elementos, $a_{13} = 24/13$ y $a_{23} = -4/13$, elementos que no pertenecen a la diagonal principal.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 24/13 & 6/13 & 1/13 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -1/13 & 2/13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/7 & 0 & 1/7 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F1 \leftarrow F1 - 24/13F3 \\ F2 \leftarrow F2 + 4/13F3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 18/(13 \cdot 7) & 1/13 & -24/(13 \cdot 7) \\ 0 & 1 & 0 & -3/(13 \cdot 7) & 2/13 & 4/(13 \cdot 7) \\ 0 & 0 & 1 & 1/7 & 0 & 1/7 \end{array} \right)$$

Finalmente, se identifica la matriz inversa,

$$(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$$

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 18/(13 \cdot 7) & 1/13 & -24/(13 \cdot 7) \\ -3/(13 \cdot 7) & 2/13 & 4/(13 \cdot 7) \\ 1/7 & 0 & 1/7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1978 & 0.0769 & -0.2637 \\ 0.0330 & 0.1539 & 0.0440 \\ 0.1429 & 0 & 0.1429 \end{pmatrix}$$