



DIGESTIO SISTEMAKO GAI XOTASUNEN DIETOTERAPIA



AURKIBIDEA

1. DIETOTERAPIA ESOFAGOKO GAIKOTASUNEAN
 - 1.1. ESOFAGITISA
2. DIETOTERAPIA URDAILKO GAIKOTASUNEAN
 - 2.1. ULTZERA
 - 2.2. GASTRITISA
3. DIETOTERAPIA HESTEKO GAIKOTASUNETAN
 - 3.1. IDORRERIA
 - 3.2. DIARREA
 - 3.3. DIBERTIKULOSIA ETA DIBERTIKULITISA
 - 3.4. KOLITIS ULTZERATIBOA
 - 3.5. CHRONEN GAIKOTASUNA
4. GIBEL, BEHAZUN XIXKU ETA PANKREA EXOKRINOAREN DIETOTERAPIA
 - 4.1. DIETOTERAPIA GIBELEKO GAIKOTASUNEAN
 - 4.1.1. HEPATITISA
 - 4.1.2. ZIRROSIA
 - 4.1.3. GIBEL ENTZEFALOPATIA
 - 4.2. BEHAZUN XIXKUAREN GAIKOTASUNEN DIETOTERAPIA
 - 4.2.1. KOLELITIASIA ETA KOLEZISTITISA
5. PANKREA EXOKRINOAREN GAIKOTASUNEN DIETOTERAPIA
 - 5.1. PANKREATITISA



DIETOTERAPIA ESOFAGOKO GAI XOTASUNEAN

- **ESOFAGITISA**



DIETOTERAPIA ESOFAGOKO GAI XOTASUNEAN

- Fisiopatologia: esofagoko mukosaren narritaduraren ondorioko hantura.
- Koadro arinak edo larriak (ultzera)
- **Seinale klinikoak:**
 - berrahoratzeak, errefluxu gastroesofagikoa
 - piroxia edo bihotzerreak, batez ere gaixoa etzanda dagoenean.



ESOFAGITISA

- Hiato hernia
- Esfinter esofagikoaren laxotasuna (adibidez arrazoi hormonalengatik).
- Esfinterra heldugabea daukaten ume-edoskitzaileak.
- Haurdunaldia: sabeleko presioak errefluxua laguntzen du.
- Obesitate abdominala.
- Helicobacter pylori, aspirina eta hantura-contrako botika gehiegi hartzea.



Tratamendua

- Helburuak:
 - Mukosaren narritadura eta errefluxu gastrikoa aurrezaintzea eta eduki gastrikoaren narritatzeko gaitasuna txikitzea dira.



Tratamendua

- Osagaiak:

Antiazidoak

Histamina-contrako farmakoak

Kolinergikoak

Beste neurri ez-farmakologiko batzuk

- Farmakologikoa

- Dietetikoa



Tratamendu farmakologikoa

- Antiazidoak:

- Magnesio hidroxidoa ($\text{Mg}(\text{OH})_2$). Bigarren mailako efektua diarrea da.
- Alumino hidroxidoa ($\text{Al}(\text{OH})_3$). Bigarren mailako efektua idorreria da.
- Aurreko bien nahastura bigarren mailako efektuak konpentsatzeko.



Tratamendu farmakologikoa

- Histamina-kontrako farmakoak (H2-kontrakoak):
 - HCl jarioa ↓. Bigarren mailako efektua B12ren absortzioa ↓ (faktore intrintsekoaren jarioa ↓ delako)



Tratamendu farmakologikoa

- Kolinergikoak:

- Esfinterra laxoegia dagonean soilik.
- Nerbio sistema parasinpatikoaren funtzioa antzeratzen dute esfinterraren tonua ↑.
- HCl jarioa ↑.



Beste neurri ez-farmakologiko batzuk

- Oheburua igo
- Jan ostean ez etzan
- Afaldu eta gero gutxienez 3 ordu itxaron oheratu baino lehen...



Tratamendu dietetiko

- Mukosa esofagikoa oso minduta dagoenean
 - Dieta biguna edo bigun-mekanikoa
- Mukosan hobekuntzak lortu eta gero:
 - Ehundura normala, konposizioan aldaketak



Tratamendu dietetiko

- **Lipidoak: Eren % 25** (esfinter esofagikoaren tonua ↓)



Arriskua bit lipodisolbagarrien gabeziak:

Elikagai giharrak A eta β -karotenoan aberatsak.



Tratamendu dietetiko

- **Proteinak:** esfinter esofagikoaren tonua ↑
 - Esne jatorrikoak > haragi jatorrikoak (CIH jarioa)

- **KHO:** aldaketarik gabe.



Tratamendu dietetiko

- **Beste neurri dietetiko batzuk:**
 - Narritagarriak ekiditea: zitrikoak, janari minak, alkohola.
 - Jariatzaileak ekiditea: alkohola, tabakoa.
 - Esfinterra erlaxatzen duten elikagaiak ekiditea: kafea, txokolatea, menta.
 - Janaria > 3 otordu, jatordu bakoitzaren bolumena txikitzeko eta, horrela, sabel presio handiak eta errefluxuaren arriskuak ekiditen dira.



Tratamendu dietetikoak

Farmakoekin:

- **Antiazidoak**: burdin, kaltzio eta fosforoaren ingestioak handitu mineralen absortzioa urritzen dutelako giro alkalinoaren ondorioz.
- Antiazidoa $Mg(OH)_2$: diarrea tratatzeko neurri dietetikoak jarraituko dira
- Antiazidoa $Al(OH)_3$: idorreria tratatzeko gomendio dietetikoak.
- **H₂-kontrakoak**: faktore intrintsekoa ↓, aho bideko B₁₂ren administrazioa ez da eraginkorra izango eta gabeziak agertzen direnean B₁₂ parenterala.