


# Ariketa praktikoa

## Gorputz kanpoko iraiketa

# ERANTZUNA



Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-Partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/> helbidean.

# Ariketa Praktikoa

## Gorputz kanpoko irazketa

1. Hiru gaixo taldeetatik, zeinetan erabilitako dosia da egokiagoa?

Argitzapen baxuena duen taldea ( $CrCl < 10$  mL/min ).

Kontzentrazio plasmaticoak bakterio ezberdinen  $CMI_{90}$  balioaren gaineratik mantentzen dira. (Taldea honetan lortzen diren kontzentrazioekin ez dago segurtasun arazorik. Antibiotiko honen tarte terapeutikoa zabala baita)

2. Gorputz kanpoko argitzapena guztizko argitzapenaren %30 baino altuagoa denean dosi aldaketa egitea ebaluatu behar da. Kasu zehatz honetan, egin beharko da?

Ez da beharrezkoa, kontzentrazio plasmaticoak  $CMI_{90}$  balioaren gaineratik daudelako

# Ariketa Praktikoa

## Gorputz kanpoko iraiketa

3. Zein izango da  
kontzentrazio  
plasmatikoen profil  
teorikoa baldintza  
hauetan?

