

AUTOEBALAKETA III ATALA

Aukeratu erantzun zuzena. Galdera bakoitzean aukera zuzen bakarra dago.

1. AIEEen baieztapen zuzena aukeratu:

- Ekintza analgesiko potentea dutenez, erabilgarriak dira min larrien tratamenduan
- Dosi altuekin, aspirina ibuprofenoa baino eraginkorragoa da mina arintzeko
- Eragin antiinflamatorioa lortzeko behar diren AIEEen dosiak txikiagoak dira eragin analgesikoa lortzekoak baino
- Inflamazio akutuan eraginkorragoak dira gaixotasun inflamatorio kronikoetan baino
- Beti preskribatu behar dira protoi ponparen inhibitzaile batekin urdal-hesteko kalteak saihesteko

2. Ondoko analgesikoen artean, bat urdaileko arazorik EZ sortzeagatik nabarmentzen da, zein?

- Ibuprofenoa
- Parazetamola
- Az. Azetilsalizilikoa
- Diklofenakoa
- Dexketoprofenoa

3. Dipironari buruzko esaldi hauen artean bat okerra da:

- Analgesikoa da
- Kalte hematologikoak sortu ditzake
- Sukarkontrakoa da
- Bide parenteraletik zein aho bidetik administratu daiteke
- Antiinflamatorioa da

4. Odontologian infekzio bakterianoen tratamendu farmakologikoari buruzko esaldi okerra aukeratu:

- Infekzio odontogenikoen aukerako tratamendua amoxicilina edo amoxicilina + az.klabulanikoa dira
- Lehen aukerako farmakoa profilaxi antibiotikoan eritromizina da
- Antibiotikoekin elkarrekintzak ematen ohi dituzten farmako batzuk antikoagulatzaileak eta aho bideko antisorgailuak dira
- Klindamizinarene ondorioz kolitis pseudomenbranosa ager daiteke
- Doxiziklina ez da haurdunaldian eman behar



5. Odontologian antifungikoen preskripzioari buruz:

- a. Miconazol antifungiko azolikoa kasu kandidiasi orofazial kasu larrietan ematen da aho-bidetik
- b. **Nistatina topikoki erabilgarria da ordezko hortzek eragindako estomatitisaren tratamendurako**
- c. Flukonazola topikoki gel moduan ematen da eta aho-mukosan atzekitxe ona dauka
- d. Tratamenduen iraupena ezin da 7 egun baino gehiagoz luzatu
- e. Aurreko guztiak oker daude

6. Klorhexidina:

- a. Itsaskortazun indize txikidun antiseptikoa da
- b. Aho-irakuzketan % 2 erabiltzen da
- c. Topikoki zein sistemikoki eman daiteke
- d. Eraginkorra izateko epe luzeetan aplikatu behar da
- e. **Indikazioen artean afta eta ultzeren tratamendua dago**

7. Gingibitis ultzeratiba nekrozatzaile akutuaren tratamendu farmakologikoa:

- a. **Metronidazol**
- b. Azitromizina
- c. Flukonazol
- d. Doxiziklina
- e. Aziklobir

8. Prozedura odontologiko labur baten sedazio behar bada, ze farmako aukeratuko zenuke?

- a. **Triazolam**
- b. Diazepam
- c. Midazolam
- d. Lormetazepam
- e. Clobazam



9. Aukeratu baieztapen okerra anestesiko lokalarekin batera emandako hodi-uzkurtzaileei buruz:

- a. Anestesikoaren eragina luzatzen du
- b. Potentzia anestesikoa handitzen du
- c. Anestesikoaren toxikotasuna murrizten du
- d. **Kartutxoan, hodi-uzkurtzailearen kantitatea portzentaian (%) adierazten da**
- e. Fenilpresina haukerako hodi-uzkurtzailea da gaixotasun kardiobaskularra duten pazienteetan

10. Anestesiko lokalen preskripzioa. Aukeratu baieztapen zuzena:

- a. Lidokaina (%1) + adrenalina (1:100.000) gel moduan topikoki ematen da ultzeren tratamendurako
- b. Lidokaina (%2) + fenilpresina (1:50.000) hemostatiko moduan erabilgarria da
- c. **Lidokaina (%2) + adrenalina (1:50.000) erabilgarria da lidokaina estandarrekin egindako anestesia infiltratiboaren errefortzu bezala**
- d. Artikaina 0,4%eko kontzentrazioan aurkezten den bakarra da
- e. Bupibakainak eraginaren hasiera geldoagoa eta iraupen laburragoa dauka beste anestesikoen baino, horregatik gutxi erabiltzen da odontologian

