

# Enfermería en otorrinolaringología

Tema 5: Cirugía del oído

Facultad de Medicina y  
Enfermería



Universidad  
del País Vasco

Euskal Herriko  
Unibertsitatea

NAZIOARTEKO  
BIKAINASUN  
CAMPUSA  
CAMPUS DE  
EXCELENCIA  
INTERNACIONAL

# Índice

1. CIRUGÍA DEL OÍDO
2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DEL OÍDO



# 1. CIRUGÍA DEL OÍDO

- 1.1 Estapedectomía
- 1.2 Timpanocentesis
- 1.3 Timpanoplastia
- 1.4 Mastoidectomía



Universidad  
del País Vasco

Euskal Herriko  
Unibertsitatea

NAZIOARTEKO  
BIKAINTASUN  
CAMPUSA

CAMPUS DE  
EXCELENCIA  
INTERNACIONAL

## 1. 1 Estapedectomía

- Técnica quirúrgica cuyo objetivo es reparar la otoesclerosis.
- 2 tipos:
  - Estapedectomía: extirpación completa y reconstrucción.
  - Estapedotomía: extirpación incompleta (generalmente se cambia la platina del estribo) y reconstrucción.
- Complicaciones: mareos o vértigos intensos.
- Tratamiento: atención a los vómitos, dieta absoluta, hidratación parenteral y medicación con sedantes vestibulares.

## 1.2 Timpanocentesis

- Punción de la membrana timpánica: miringotomía.



### 1.3 Timpanoplastia

- Técnica quirúrgica para reparar las lesiones del oído medio.
  1. Membrana timpánica
  2. Huesecillos

### 1.4 Mastoidectomía

- Reparación quirúrgica del mastoides.
- Riesgo de sordera.

## 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DEL OÍDO



Universidad  
del País Vasco

Euskal Herriko  
Unibertsitatea

NAZIOARTEKO  
BIKAINTASUN  
CAMPUSA

CAMPUS DE  
EXCELENCIA  
INTERNACIONAL



### 2. Cuidados de enfermería en la cirugía del oído (en general)

1. Mantener la higiene
2. Medidas generales en el postoperatorio
3. Cuidar la postura
4. Reposo
5. Estar alerta ante los signos de alarma
6. Realizar curas según órdenes médicas
7. Apoyo psicológico
6. Evitar los esfuerzos
7. Evitar el agua (no deporte acuático y evitar mojar oído durante el baño o higiene personal)
8. Evitar la presión (evitar barotraumas: no avión, no buceo)
9. Cuando se retiren los puntos, el CAE deberá quedar abierto (sin algodones que lo obstruyan)



### Estapedectomía

- En el caso de realizar al paciente una estapedectomía, la parálisis facial es una complicación infrecuente de la cirugía del oído y para evidenciarla es necesario de que enfermera valore la función facial
- Para ello, solicitará al paciente que cierre los ojos o que enseñe los dientes

### Estapedectomía

- Cuidados de enfermería en caso de parálisis facial:
  - Evitar la falta de humedad en el ojo afectado (por falta de parpadeo)
  - Poner lágrimas artificiales
  - Poner pomadas lubricantes
  - Colocar un parche en el ojo afectado para dormir
  - Cuidados de la alimentación:
    - Evitar la boca seca
    - Si se le escapa el líquido de la boca, se deberá instruir al paciente para cuidar ese aspecto
    - Masticar por el lado sano



### Mastoidectomía radical

- La enfermera realizará la primera cura del oído operado al cabo de 3-5 días tras la intervención quirúrgica
- Será necesario retirar con cuidado la gasa insertada en el oído
- Si pequeñas gotas sanguinolentas, ¡no alarmarse!
- Si aparece olor fétido, avisar al otorrinolaringólogo para que le realice una valoración



Universidad  
del País Vasco

Euskal Herriko  
Unibertsitatea

NAZIOARTEKO  
BIKAINTASUN  
CAMPUSA  
CAMPUS DE  
EXCELENCIA  
INTERNACIONAL