



Autoevaluación PARTE III (temas 9-13)

1.- Indique la opción correcta respecto del mecanismo de acción de los AINE:

- a) Todos los AINE tienen la misma afinidad por COX1 que por COX2.
- b) Modifican la expresión génica de mediadores inflamatorios.
- c) Actúan sobre receptores nucleares.
- d) **Algunos inhiben selectivamente la COX2.**
- e) El paracetamol inhibe de forma irreversible la COX1 plaquetar.

2.- De los siguientes fármacos antiinflamatorios, ¿cuál tiene mayor riesgo de producir tromboembolismo?:

- a) Paracetamol
- b) **Celecoxib**
- c) Acido acetilsalicílico
- d) Ibuprofeno
- e) Diclofenaco

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los AINE?:

- a) La aspirina puede incrementar el tiempo de sangrado si se asocia con anticoagulantes orales
- b) **Aumentan los efectos de los diuréticos**
- c) Actúan inhibiendo la ciclooxigenasa
- d) Se utilizan para tratar dolores leves-moderados
- e) El paracetamol no tiene actividad antiinflamatoria

4.- Sobre los glucocorticoides, indique la opción falsa:

- a) Se utilizan para evitar rechazos a órganos trasplantados.
- b) **Son analgésicos eficaces.**
- c) Actúan a través de receptores nucleares.
- d) Su uso crónico puede producir síndrome de Cushing.
- e) Su uso crónico puede inhibir la secreción endógena de corticoides.

5.- Entre los usos terapéuticos de los glucocorticoides no se encuentra:

- a) Shock anafiláctico
- b) **Osteoporosis**
- c) Artritis reumatoide
- d) Asma
- e) Artrosis de rodilla

6.- La lidocaína:

- a) **Es un anestésico local**
- b) Su principal indicación es el dolor oncológico
- c) Bloquea los canales de potasio voltaje dependientes
- d) Se administra vía oral
- e) Producen úlceras gastroduodenales



- 7.- De los siguientes fármacos, ¿cuál se utiliza habitualmente para reducir la tos?:
- a) Codeína
 - b) Morfina
 - c) Naltrexona
 - d) Adrenalina
 - e) Naloxona
- 8.- Sobre la metadona, ¿qué opción es correcta?:
- a) Es un agonista adrenérgico.
 - b) Produce analgesia.
 - c) Activa los receptores GABA_A.
 - d) Se utiliza como tratamiento de las sobredosis por agonistas opioides.
 - e) Es un antagonista opioide.
- 9.- ¿Qué fármaco se utiliza para tratar la sobredosis de opioides?:
- a) Naloxona
 - b) Heroína
 - c) Fentanilo
 - d) Metadona
 - e) Codeína
- 10.- Indique la opción correcta sobre la buprenorfina:
- a) Tiene un efecto analgésico menos duradero que morfina.
 - b) Es un analgésico más eficaz que morfina.
 - c) Como es más lipófilo que morfina se puede administrar en forma de parches.
 - d) Es un antagonista opioide.
 - e) Se utiliza habitualmente para tratar el estreñimiento.