



5. GAIA: ARIKETA EBATZIAK

1. Kolesterola kontrolatzeko analisisien %8-ak emaitza okerrak ematen ditu eta analisisia errepikatu behar da.

- a) Analisi bat egiten bada zein da emaitza okerra izatearen probabilitatea?
- b) Zoriz 15 analisi behatzen badira, zein da gutxienez 2 analisi errepikatu behar izatearen probabilitatea?
- c) Zein da 200 analisisitan errepikatzea espero diren analisi kopurua?
- d) Egun batean laborategian 50 analisi egin badira, zein da gehienez 3 analisi errepikatzeko probabilitatea?

a) Lehenik eta behin zorizko aldagai definitu eta honek jarraitzen duen banaketa ipini behar da.

X : 'Emaitza okerreko kolesterol analisisia'

$X \sim \text{Binario}(p = 0,08)$

$P(X = 1)$

`> dbinom(1,1,0.08)`

[1] 0.08

b) Kasu honetan, esperimentu binario hainbat alditan errepikatzen da beraz zorizko aldagai berri bat definitu eta honek jarraitzen duen banaketa ipini behar da.

X : 'Emaitza okerreko kolesterol analisi kopurua'

$X \sim B(n = 15, p = 0,08)$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$

`> 1 - pbinom(1,15,0.08)`

[1] 0.3402712



c) Errepikatzea espero diren analisi kopurua kalkulatzeko, batezbestekoa kalkulatu behar da.

$$n = 200$$

$$E(X) = n \cdot p$$

```
> n = 200
```

```
> p = 0.08
```

```
> n * p
```

```
[1] 16
```

d)

X : 'Emitza okerreko kolesterol analisi kopurua'

$$X \sim B(n = 50, p = 0,08)$$

Beraz,

$$P(X \leq 3)$$

```
> pbinom(3, 50, 0.08)
```

```
[1] 0.4252957
```

2. Ultrasonu ekipo batekin egindako entseguak eraginkorrak izateko probabilitatea %80-koa da. Suposatuz egindako entseguak elkarrekiko independenteak direla, kalkulatu:
- Lehenengo entsegu eraginkorra bostgarren entseguan gertatzearen probabilitatea.
 - Lehenengo entsegu eraginkorra lortzeko gutxienez lau entsegu egin behar izatearen probabilitatea.
 - 5 entsegu eraginkor izateko 12 entsegu egin behar izatearen probabilitatea.
 - 3 entsegu eraginkor izateko gehienez 10 eta gutxienez 7 entsegu egitearen probabilitatea.

a) Lehenik eta behin zorizko aldagaia definitu eta honek jarraitzen duen banaketa ipini behar da.

X : 'Lehenengo entsegu eraginkorra lortu arte egindako entsegu kopurua'

$X \sim G(p = 0,8)$

Bostgarren entseguan eraginkorra izan dadin, aurreko lau entseguak ez-eraginkorrak izan behar dira, beraz:

$P(X = 4)$

```
> dgeom(4, 0.8, log = FALSE)
```

```
[1] 0.00128
```

b) Gutxienez lau entsegu egin behar izatea, gutxienez hiru entsegu ez-eraginkorrak izatea da.

$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) =$

```
> 1 - pgeom(2, 0.8, log = FALSE)
```

```
[1] 0.008
```



c) Kasu honetan, zorizko aldagaia aldatu egin behar da eta honek jarraitzen duen banaketa desberdina da; geometriko bat izatetik binomial negatibo bat izatera pasatzen da. Bost entsegu eraginkor izateko 7 ez eraginkorrak izan behar dira.

X : '5 entsegu eraginkor lortu arte egindako entsegu kopurua'

$$X \sim BN(n = 5, p = 0,8)$$

$$P(X = 7)$$

> dnbinom(7,5,0.8)

[1] 0.00138412

d) Kasu honetan, 3 entsegu eraginkor izateko, entsegu ez eraginkorrak 4 eta 7 artean izan behar dira.

X : '3 entsegu eraginkor lortu arte egindako entsegu kopurua'

$$X \sim BN(n = 3, p = 0,8)$$

$$P(4 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 4)$$

> pnbinom(7,3,0.8) - pnbinom(4,3,0.8)

[1] 0.004594074



3. Fusibleak ekoizten dituen enpresa elektriko batean fusibleak akastunak izateko probabilitatea 0,2 izanik. Bezero batek 15 fusible erosten ditu, baina horietatik 5 bakarrik erabili behar ditu.
- Zein izango da 5 fusible horietatik gehienez 2 akastunak izateko probabilitatea?
 - Zein izango da 5 fusible horietan akastunak izatea espero diren fusible kopurua?
 - Beste bezero batek 200 fusibleko kaxa bat erosi du horietatik 10 erabiltzeko. Kasu honetan zein izango da 10 fusible horietatik gehienez 2 akastunak izateko probabilitatea?

a) Lehenik eta behin zorizko aldagaia definitu eta honek jarraitzen duen banaketa ipini behar da

X : 'Akastunak diren fusible kopurua'

$X \sim H(N = 15, n = 5, p = 0,2)$

$P(X \leq 2)$

```
> phyper(2,3,12,5,log = F)
```

```
[1] 0.978022
```

b) Akastunak izatea espero diren fusible kopurua kalkulatzeko, batezbestekoa kalkulatu behar da.

$n = 5; p = 0,2$

$E(X) = n \cdot p$

```
> n = 5
```

```
> p = 0.2
```

```
> n * p
```

```
[1] 1
```



c) Kasu honetan $N = 200$ eta $n = 10$ izanik, eta $N > 10 \cdot n$, betetzen da beraz banaketa hipergeometrikoa, binomial batera hurbil daiteke.

X : 'Akastunak diren fusible kopurua'

$X \sim H(N = 200, n = 10, p = 0,2)$

$P(X \leq 2)$

```
> 200*0.2
```

```
[1] 40
```

```
> 200*0.8
```

```
[1] 160
```

```
> phyper(2,40,160,10,log=F)
```

```
[1] 0.6794051
```



4. Edinburgoko artile fabrika batean, ekoiztutako oihalaren 5 metroko akats bat agertzen da. Oihalean agertutako akats kopurua Poisson-en banaketa bat jarraitzen duela jakinik. Kalkulatu:
- Artilez egineko oihalaren bost metro erosten badira, bi defektu baina gehiago egoteko probabilitatea
 - “Kilt” izeneko 15 gona bat egiteko, 50 metro oihal erosten badira, zazpi akats aurkitzeko probabilitatea.

a) Lehenik eta behin zorizko aldagaia definitu eta honek jarraitzen duen banaketa ipini behar da.

X : 'Artilezko oihalaren bost metrotan dagoen akats kopurua'

$X \sim P(\lambda = 1)$

$P(x > 2) = 1 - P(x \leq 2)$

`> 1 - ppois(2, 1, log = F)`

`[1] 0.0803014`

b) Kasu honetan λ parametro berri bat kalkulatu behar da. Zorizko aldagaia orain aldatu egin da eta. Bost metro eduki beharrean 50 metro daude beraz, λ parametroa linealki aldatuko da.

X : 'Artilezko oihalaren 50 metrotan dagoen akats kopurua'

$X \sim P(\lambda = 1 \cdot 10)$

$P(x = 7)$

`> dpois(7, 10, log = F)`

`[1] 0.09007923`



5. Ikasle batek etxetik unibertsitateraino iristeko behar duen denbora uniformeki aldatzen da 35 eta 45 minutu artean. Zein ordutan atera behar da etxetik gutxienez 0,8eko probabilitatearekin klasera garaiz iristeko, klaseak goizeko 8tan hasten badira?

X = "Etxetik unibertsitatera bidean pasatzen diren minutuak"

Aldagaiak banaketa uniforme jarraitzen du.

R-Studio erabiliz:

```
> qunif(0.8, 35, 45)
```

```
[1] 43
```

Beraz:

$$P(X \leq x) \geq 0,8 \Rightarrow \frac{x-35}{45-35} \geq 0,8 \Rightarrow x \geq 43$$

Beraz, etxetik 7:17tan edo lehenago ateratzen bada ikaslea, klasera garaiz iristeko probabilitatea 0,8 edo handiagoa izango da.

6. Denda batean, bezero batetik hurrengo bezeroa sartu arte itxaron behar den denbora era esponentzialean banatzen da batez bestekoa 5 minutu izanik. Kalkulatu hurrengo bezeroa sartu arte 8 eta 10 minutu bitartean itxaron behar izateko probabilitatea.

X : 'Hurrengo bezeroa sartu arte itxaron beharreko minutuak'

$$E(X) = 5 = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{5}$$

$$P(4 \leq X \leq 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 4)$$

R-Studio erabiliz:

```
> pexp(6,1/5) - pexp(4,1/5)
```

```
[1] 0.1481348
```

7. Konfitura-pote bat 'almibar' bezela kalifika daiteke azukreko kantitatea 420 eta 520 g artean badago. Fabrikatzaileak konfitura-potoak aztertzerakoan batez besteko pisua 465 g-koa dela ikusten du, desbideratze tipikoa 30 g izanik. Azukreko pisuak banaketa normal bati jarraitzen diola jakinik,
- Fabrikatzailearen ekoizpenaren zein portzentaia ezin da 'almibar' bezela etiketatu?
 - Zeintzuk dira finkatu behar ditugun bi balio zentralak beraien artean poteen %50a egon dadin?

X : 'Konfitura-potean dagoen azukre kantitatea g-tan.'

$420 \leq X \leq 520 \rightarrow$ 'Almibar' bezala izendatu daiteke konfitura-potea

$X < 420$ eta $X > 520 \rightarrow$ Konfitura-potea ezin da 'Almibar' bezala izendatu

$$E(x) = 465 \quad \text{eta} \quad \sigma = 30 \quad X \sim N(465;30)$$

a)

Bi modutara kalkulatuko dugu:

1)

$$P(420 \leq X \leq 520) = P(X \leq 520) - P(X \leq 420)$$

R-Studio erabiliz:

$$> \text{pnorm}(520, 465, 30) - \text{pnorm}(420, 465, 30)$$

[1] 0.8998163

$$1 - P(420 \leq X \leq 520) = 0,1004$$

Beraz % 10,04a ezin da 'almibar' bezala etiketatu.

2)

$$P(X \geq 520) + P(X \leq 420)$$

R-Studio erabiliz:

$$> \text{pnorm}(520, 465, 30, \text{lower.tail} = \text{F}) + \text{pnorm}(420, 465, 30)$$

[1] 0.1001837

$$P(X \geq 520) + P(X \leq 420) = 0,1004$$

Beraz % 10,04a ezin da 'almibar' bezala etiketatu.



b)

Banaketa normal tipifikatua erabiliko dugu:

$$P(b \leq X \leq a) = P(X \leq a) - P(X \leq b)$$

$$Z = \frac{x - 465}{30}$$

Atal hau ebazteko simetria aplikatuko dugu behin eta berriz:

$$P(b \leq X \leq a) = P(-t \leq Z \leq t) = P(Z \leq \frac{a - 465}{30}) - P(Z \leq \frac{b - 465}{30}) = P(Z \leq t) - P(Z \leq -t)$$

$$P(b \leq X \leq a) = P(Z \leq t) - P(Z \leq -t) = P(Z \leq t) - P(Z \geq t) =$$

$$P(Z \leq t) - (1 - P(Z \leq t)) = -1 + 2P(Z \leq t) = 0,5 \Rightarrow P(Z \leq t) = 0,75$$

R-Studio erabiliz

`> qnorm(0.75, 0, 1)``[1] 0.6744898`

$$P(Z \leq t) = 0,75 \Rightarrow t = 0.6744898$$

$$t = \frac{a - 465}{30} \Rightarrow a = 485,234694 \quad \text{eta}$$

$$-t = \frac{b - 465}{30} \Rightarrow b = 444,765306$$

Beraz a eta b puntu zentralak 485,234694 eta 444,765306 izango dira.



8. Fabrika batean bi pieza mota ekoizten dira: bat material berriztagarriekin egina dago eta bestea petroleotik eratorritako lehengaiekin.
- %2-a akastuna bada, zein da 100 pieza aukeratzekoan gehienez 3 akastun egoteko probabilitatea?
 - %40-a material berriztagarrietan oinarrituriko piezak dira. Zein da 600 pieza aukeratzekoan 352 pieza edo gehiago petroleotik eratorritako lehengaiekin egindako piezak izatearen probabilitatea?

a)

X : 'akastun pieza kopurua'

$n=100$; $p=0,02$ $X \sim B(100;0,02)$

R-Studio erabiliz:

```
> pbinom(3,100,0.02)
```

```
[1] 0.8589616
```

$P(X \leq 3)=0.8589616$

b)

X : 'petroleotik eratorritako lehengaiekin egindako pieza kopurua'

$n=600$; $p=0,6$ $X \sim B(600;0,6)$

R-Studio erabiliz

```
> pbinom(351,600,0.6,lower.tail = F)
```

```
[1] 0.7610461
```

$P(X \geq 352) = 0.7610461$

beraz, kasu honetan ez dugu behar hurbilketarik egitea R-Studio-k egiten dituelako kalkuluak.